

جدول مقایسه ای شاخص های داروهای تجویزی پزشکان استان اصفهان و پزشکان کشور

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ایران ۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	سال	شاخص
۳۳.۸۵۸.۱۸۶	۱۰.۴۰۲.۸۸۱	۱۲.۳۲۸.۹۸۹	۱۱.۹۲۵.۵۸۱	۵.۴۸۷.۶۹۴	۹.۱۶۶.۵۵۱	۸.۹۰۷.۲۳۸		تعداد نسخ پردازش شده (کلیه پزشکان)
۳/۱۶	۲/۹۸	۳/۱۲	۳/۱۷	۳/۱۶	۳/۱۴	۳/۱۷		میانگین اقلام دارویی
	۳/۲۱	۳/۳۷	۳/۴۷	۳/۴۵	۳/۳۹	۳/۴۳		پزشکان عمومی
۴۵	۳۷	۴۰	۴۱	۴۲	۳۹	۴۰		درصد بیماران دریافت کننده داروهای تزریقی
	۴۵	۴۹	۵۲	۵۲	۵۱	۵۰		پزشکان عمومی
۴۸	۴۱	۴۴	۴۵	۴۶	۴۳	۴۶		درصد بیماران دریافت کننده آنتی بیوتیک
	۴۶	۵۱	۵۳	۵۳	۵۱	۵۴		پزشکان عمومی
۲۶	۱۹	۲۱	۲۳	۲۳	۲۲	۲۲		درصد بیماران دریافت کننده کورتیکواستروئید
	۲۲	۲۶	۲۹	۲۹	۲۸	۲۷		پزشکان عمومی
۱۳/۹۷	۱۰/۸۷	۱۲/۶۱	۱۳/۹۶	۱۴/۰۳	۱۲/۵۱	۱۲/۷۶		درصد بیماران دریافت کننده دگزامتازون
	۱۳/۳۵	۱۶/۱۵	۱۸/۷۷	۱۸/۵۸	۱۷/۲۱	۱۷/۰۲		پزشکان عمومی
۴/۳۷	۳/۸۰	۴/۴۹	۴/۷۶	۳/۸۲	۳/۵۹	۴/۹۹		درصد بیماران دریافت کننده پنی سیلین
	۵/۴۰	۶/۴۴	۶/۹۶	۵/۳۹	۵/۰۴	۷/۰۷		پزشکان عمومی
۴/۴۹	۴/۱۲	۴/۵۰	۴/۴۶	۴/۰۶	۳/۳۷	۲/۸۳		درصد بیماران دریافت کننده سفیکسیم ۴۰۰
	۴/۵۶	۵/۱۷	۵/۱۸	۴/۶۰	۳/۶۶	۳/۰۵		پزشکان عمومی